



Observatorio
de la Deuda
Social Argentina

COMPORTAMIENTOS Y CREENCIAS EN TORNO A LA VACUNACIÓN Y MIEDO AL CONTAGIO DE COVID-19 EN LA POBLACIÓN URBANA

INFORME RESUMEN DE DIFUSIÓN

SOLANGE RODRÍGUEZ ESPÍNOLA, PILAR FILGUEIRA, MARÍA
AGUSTINA PATERNÓ MANAVELLA Y CAROLINA GARÓFALO

29 DE DICIEMBRE DEL 2021

INTRODUCCIÓN

- Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina se han realizado publicaciones en los últimos dos años que evidencian las condiciones de salud en contexto de pandemia, sin embargo, desde este informe se propone poner en el escenario no sólo la acción de la política pública para contener y prevenir al SARS COV-19, sino las conductas de la población frente a la posibilidad de vacunarse y el miedo provocado por el virus.
- Se analizarán perfiles de personas que fueron encuestadas entre julio y octubre del 2021, que si bien los datos que se presentan en este informe no surgen de un estudio epidemiológico propiamente dicho, resulta útil servirnos de una serie de ideas de ese campo de investigación para aportar desde los comportamientos frente a la posibilidad de vacunarse.
- Así, el registro acerca de la presencia de algún padecimiento no fue producto de un diagnóstico médico sino de la percepción y la enunciación por parte del propio sujeto encuestado. En tanto que, esta forma de cuantificar la prevalencia de problemas de salud y la referencia a haber tenido COVID-19 no responde al enfoque epidemiológico tradicional ya que la condición de padecer o no problemas físicos/biológicos fue reconstruida para cada individuo a partir de la comparación de su propio juicio acerca de su situación de salud.

INTRODUCCIÓN

- No es menor mencionar que desde la EDSA puede haber un sub-registro de casos en la declaratoria diagnóstica de las personas respecto al COVID-19, considerando que pueden haber tenido síntomas leves subestimados o bien haber sido asintomáticos.
- En este contexto, al momento en el que comenzaron a recolectarse los datos con la EDSA 2021 -el 5 de julio- los nuevos casos de COVID-19 en Argentina fueron 17.277 ese día, siendo los casos totales a nivel nacional 4.552.750. El 39,5% de la población se encontraba vacunada; 29,78% con una sola dosis, y el 9,72% con ambas dosis según fuentes del Ministerio de Salud de la Nación.
- Al día de cierre de la encuesta, el 5 de octubre, los nuevos casos del día a nivel nacional fueron 1.216. Los casos totales, para ese entonces, habían ascendido a 5.260.719. En ese momento, ya el 65,6% de la población argentina estaba vacunada y al final del trabajo de recolección de datos de la EDSA, se estaba comenzando a vacunar a los menores de 18 años en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
- La cantidad de fallecidos por COVID-19 disminuyó considerablemente durante los tres meses que duró la recolección de datos de la EDSA 2021: el 5 de julio hubo 617 muertos por COVID-19, mientras que el 5 de octubre los fallecidos fueron 40.

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA (EDSA-UCA)

- La Encuesta de la Deuda Social Argentina surge de un diseño muestral probabilístico de tipo polietápico estratificado y con selección sistemática de viviendas, hogares y población en cada punto muestra (5760 hogares).
- El cuestionario es multipropósito; consta de un módulo del hogar, un módulo que releva información para cada uno de los integrantes del hogar y un módulo de relevamiento individual sobre el entrevistado. Se complementa con un módulo de infancia que se aplica a todos los miembros del hogar menores de 18 años.


RELEVAMIENTO EDSA 2021

- El trabajo de campo de la EDSA 2021 se realizó a través de entrevistas personales realizadas en forma telefónica y presencial a miembros referentes del hogar seleccionados según cuotas de edad, sexo y condición de actividad.
- El relevamiento se desarrolló durante tres fases/modalidades: a) entrevista telefónica a hogares/respondientes de la EDSA 2020 (casos panel 2020-2021) de los cuales se contaba con teléfono personal, b) entrevista telefónica a nuevos hogares (para lo cual se obtuvieron teléfonos fijos y celulares a través de un relevamiento presencial previo a la encuesta, y c) entrevista presencial en estratos indigentes y para completar cuotas faltantes no cubiertas por las otras modalidades.

Al finalizar el trabajo de campo los resultados alcanzados fueron:

5.758 Hogares ----- 17.684 Componentes ----- 4.254 Niños

ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA 2010-2021



El universo geográfico de la EDSA abarca de grandes y medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier - Cipolletti, Mar del Plata, Salta, Tucumán - Tafí Viejo, Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.

FICHA TÉCNICA EDSA NUEVA ETAPA	
ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA / NUEVA ETAPA 2017-2025	
Dominio	Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.
Universo	Hogares particulares. Población de 18 años o más.
Tamaño de la muestra	Muestra puntual hogares/personas: 5.760 casos por año.
Tipo de encuesta	Multipropósito longitudinal.
Asignación de casos	No proporcional post-calibrado.
Puntos de muestreo	Total 960 radios censales (Censo Nacional 2010), 836 radios a través de muestreo estratificado simple y 124 radios por sobre muestra representativos de los estratos más ricos y más pobres de las áreas urbanas relevadas.
Dominio de la muestra	Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) Gran Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte, Conurbano Zona Oeste y Conurbano Zona Sur); 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, y Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.
Procedimiento de muestreo	Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada manzana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que los individuos dentro de cada vivienda son elegidos mediante un sistema de cuotas de sexo y edad.
Criterio de estratificación	Un primer criterio de estratificación define los dominios de análisis de la información de acuerdo a la pertenencia a región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un criterio socio-económico de los hogares. Este criterio se establece a los fines de optimizar la distribución final de los puntos de relevamiento. Calibración por dominio, estrato, edad, sexo y condición de actividad de población de 18 años y más.
Fecha de realización	Tercer trimestre de 2021.
Error muestral (hogares)	+/- 1,3%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.

Dimensión	Variable	Definición conceptual	Definición operacional
COVID-19	Tener COVID-19	Mide la prevalencia de personas que declararon haber padecido la enfermedad de COVID-19 con o sin internación.	Porcentaje de personas que declaran haber tenido la enfermedad de COVID-19, condición a partir de la cual pueden haber sido internadas o no.
	Estado de vacunación	Mide el estado de vacunación de las personas a la campaña preventiva contra el COVID-19	Porcentaje de personas que se aplicaron una o dos dosis de la vacuna, o no se vacunó contra el COVID-19.
	Miedo a contagiarse de COVID-19	Mide el miedo de las personas de contagiarse de COVID-19	Porcentaje de personas que dicen haber tenido siempre o muchas veces miedo a contagiarse de COVID-19 en el último mes.

ESTADO Y ATENCIÓN DE LA SALUD	Estado de salud percibido	Mide el estado general de salud percibido por las personas desde una noción que integra las dimensiones física, biológica y psicológica	Porcentaje de personas que dicen tener bastantes problemas de salud, padecer enfermedades crónicas o graves
	No realizar consulta médica	Mide la falta de asistencia a una visita profesional médica para realizar control, prevención o tratamiento.	Porcentaje de personas que afirmaron no haber realizado una consulta médica durante el último año

Dimensión	Variable	Definición conceptual	Definición operacional
CONDICIONES Y RECURSOS PSICOSOCIALES	Malestar psicológico	Mide el déficit de las capacidades emocionales a través de sintomatología ansiosa y depresiva de las personas. El malestar psicológico dificulta responder a las demandas ordinarias de la vida cotidiana, desenvolverse socialmente y tener relaciones satisfactorias con los otros.	Porcentaje de personas que mencionaron síntomas de ansiedad y depresión integradas en una puntuación que indica riesgo moderado o alto de malestar psicológico en la escala KPDS-10.
	Afrontamiento negativo	Mide el modo de enfrentar el estrés por predominio de estrategias y conductas destinadas a evadir ocasiones para pensar en la situación problemática, sin realizar intentos activos por afrontar o tratar de resolver la situación.	Porcentaje de personas que revelaron un predominio de estrategias evitativas o pasivas de afrontamiento al estrés.
	Creencia de control externo	Mide el predominio de creencia acerca del grado en que la propia conducta es o no eficaz para modificar positivamente el entorno. Sensación de estar a merced del destino y considerar que sus conductas están exteriormente dirigidas	Porcentaje de personas que sostiene un sistema de creencias de control externo.
	Sentirse poco o nada feliz	Mide la percepción negativa del estado de ánimo que produce en la persona una sensación de insatisfacción y tristeza en su vida	Porcentaje de personas que aseveraron sentirse nada o poco felices en su vida.
	Déficit de apoyo social estructural	Percepción de no contar con una red de apoyo por considerarse sin amigos y en ausencia de alguien a quien recurrir frente a una necesidad	Porcentaje de personas que afirmaron no tener amigos y/o sentirse solos y no tener a nadie a quien acudir.


COVID-19: Declaración de haber padecido la enfermedad en población urbana argentina



RESUMEN DE EVIDENCIAS

- Los datos relevados a través de la EDSA consideran que la prevalencia del COVID-19 fue en el 19% de la población encuestada, considerando que sólo el 1% tuvo que estar internado en un centro asistencial de salud.
- Según grupos de edad, la información de haber padecido COVID-19 es de cerca de 23% en los adultos de 18 a 59 años, en tanto que la declaración decae al 13% en los menores de edad y alrededor del 10% en las personas mayores. Cabe destacar que la internación tiene mayor registro en el grupo de 60 a 74 años.
- No se observan diferencias respecto a la prevalencia de haber padecido SARS-COV-19 según sexo.
- Las personas de estratos socio-ocupacionales medios alcanzan el 22% en la declaración de haber contraído el virus, en tanto que levemente por debajo en los encuestados de estrato bajo integrado (19%) y con menor prevalencia en las personas de estrato bajo marginal (13%).
- Según análisis por aglomerados urbanos, las personas de CABA reportan menor prevalencia de haber tenido COVID-19.

HABER TENIDO COVID-19 SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN A PARTIR DE 0 AÑOS DE EDAD Julio - Octubre 2021




■ sí, con internación ■ sí, sin internación ■ No

HABER TENIDO COVID-19 SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL Y AGLOMERADO


EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 0 AÑOS DE EDAD

Julio - Octubre 2021

SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL



SEGÚN AGLOMERADO




COVID-19: Miedo al contagio y estado de vacunación en población urbana argentina





RESUMEN DE EVIDENCIAS

- Los resultados sobre el estado de vacunación contra el COVID-19 indican que entre julio y octubre un 45,8% de la población urbana tenía una dosis de la vacuna, un 37,8% tenía dos dosis y un 16,3% todavía no se había vacunado.
- Para dicho período, el 30,9% afirmaba tener miedo al contagio de COVID-19, un 27,3% a veces y un 41,8% afirmó no tener miedo al contagio de COVID-19. Asimismo, se evidencia una disminución del miedo al contagio con el avance de los meses.

ESTADO DE VACUNACIÓN EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021



MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN MES DE RELEVAMIENTO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021




RESUMEN DE EVIDENCIAS

- El estado de vacunación contra el COVID-19 difiere según la vulnerabilidad socio-ocupacional. Es más frecuente para aquellas personas que pertenecen al estrato medio profesional, representado por un 53,5% la obtención de dos dosis. La vacunación con dos dosis desciende en los estratos medios no profesionales y bajo integrado (37,7% y 37,2%, respectivamente), y disminuye aún más en el bajo marginal (29%).
- Al mismo tiempo, la ausencia total de vacunación sigue una tendencia inversa, es decir, este déficit aumenta según las posición socio-ocupacional del hogar: afecta al 12,5% del estrato medio no profesional, al 14,8% de los sectores medios no profesionales, al 15,4% de las clases medias bajas y al 23,6% de los estratos bajo marginales.

ESTADO DE VACUNACIÓN SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021

SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL




RESUMEN DE EVIDENCIAS


- El grupo de edad que ha obtenido una mayor tasa de vacunación con dos dosis corresponde a las personas mayores, considerado como grupo de riesgo. En primer lugar, aquellos de 75 años y más (77,7%), y le sigue el grupo de 60 a 74 años con un 58,8%. El grupo de 35 a 59 años obtuvo vacunación con dos dosis en un 37,6%, y, por último, el grupo de 18 a 34 años con un 21,8%, siendo éste el que incluye mayor cantidad de personas sin vacunar.
- No se observan diferencias significativas en el estado de vacunación en dos o una dosis entre los que habitan en el Conurbano Bonaerense, en otras áreas metropolitanas y en el resto urbano. Sin embargo, la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha sido la que en mayor medida ha accedido a la vacunación con dos dosis (54,3%).

ESTADO DE VACUNACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y AGLOMERADO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021

SEGÚN GRUPOS DE EDAD



SEGÚN AGLOMERADO



RESUMEN DE EVIDENCIAS

- Los datos muestran que el nivel de miedo de contagio ante la enfermedad de COVID-19 fue desigual en función de características estructurales de la población. Teniendo en cuenta perfiles basados en características socioeconómicas, laborales y educativas, observamos que en los estratos socio-ocupacionales más bajos refieren tener más miedo al contagio. Al respecto, el 39% de las personas en hogares del estrato bajo marginal y el 32% de las personas del estrato bajo integrado dicen haber tenido siempre o muchas veces miedo a contagiarse de COVID-19 en el último mes.
- Por su parte, en los estratos medio profesional y medio no profesional, en quienes el acceso al esquema completo de vacunación contra el COVID-19 fue antes, denotan en un 27% haber tenido siempre o muchas veces miedo a contagiarse en el último mes. La mitad de personas de estos estratos dicen no haber tenido miedo a contagiarse nunca o pocas veces en el mes previo.

RESUMEN DE EVIDENCIAS


- Los resultados demuestran que en el AMBA, incluyendo CABA y 30 partidos del Conurbano Bonaerense, las personas muestran menor frecuencia de miedo ante el contagio que otros grandes aglomerados del país. La mitad de las personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires dicen no haber tenido temor nunca o pocas veces en el último mes y menos del 30% refiere haber tenido miedo siempre o muchas veces en el último mes. En otras grandes áreas metropolitanas, tales como Rosario y Córdoba, el 40% de las personas refieren miedo ante el contagio.
- Teniendo en cuenta características individuales de la población urbana: el 35% de las mujeres dice tener miedo al contagio, superando por 10 pp. a los varones (26%), mientras que el nivel de miedo ante el contagio aumenta marcadamente según la edad. La mitad de los jóvenes de 18 a 34 años no tuvieron miedo a contagiarse nunca o pocas veces en el último mes. Las personas de 60 años y más, pertenecientes al grupo de riesgo ante el COVID-19, dicen en un 45% tener miedo siempre o muchas veces a contagiarse, frente al 24% de las personas de 18 a 34 años.

MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL Y AGLOMERADO


EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 18 AÑOS Y MÁS

Julio - Octubre 2021

SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL




SEGÚN AGLOMERADO




MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021

SEGÚN GRUPOS DE EDAD




SEGÚN SEXO




MIEDO AL CONTAGIO Y ESTADO DE VACUNACIÓN EN EL PRINCIPAL SOSTÉN DEL HOGAR EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021

MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN PSH



ESTADO DE VACUNACIÓN SEGÚN PSH




El principal sostén económico del hogar (PSH) mostró mayor estado de vacunación y a la vez, más miedo a contagiarse de COVID-19 que aquellos que no tienen esta responsabilidad familiar. El 44% de las personas que sostienen económicamente al hogar recibió el esquema completo de vacunación, frente al 29% de quienes no son el PSH.

RESUMEN DE EVIDENCIAS


- Los resultados indican un nivel de miedo al contagio de COVID-19 levemente mayor en personas que no tuvieron o creen no haber tenido la enfermedad y en quienes padecieron la COVID-19 y una internación asociada a la enfermedad. Específicamente, casi el 60% de las personas de estos grupos dicen haber tenido siempre, muchas o algunas veces miedo a contagiarse en el último mes.
- Por su parte, en aquellos que refieren haber enfermado de COVID-19 aunque sin complicaciones que le supusieran una internación hospitalaria asociada a la enfermedad, el grado de miedo al contagio de COVID-19 resulta menor (54%).
- Resulta llamativo que la mitad de las personas que no han recibido la vacuna contra la COVID-19, dicen no tener miedo a contagiarse. Estos valores superan por 10 pp. los guarismos de quienes recibieron una o dos dosis de la vacuna. Al respecto, las personas que recibieron el esquema completo -dos dosis de la vacuna- refieren en un 35% haber tenido siempre o muchas veces miedo a contagiarse en el último mes, siendo el grupo que exhibe mayor nivel de miedo.

ESTADO DE VACUNACIÓN Y HABER TENIDO O NO COVID-19 SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021

HABER TENIDO COVID-19 SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO




MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN ESTADO DE VACUNACIÓN



Condiciones de salud y recursos psicosociales asociados a la enfermedad de COVID-19




MALESTAR PSICOLÓGICO SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO PORCENTAJE PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021



Los perfiles de los que tienen malestar psicológico, que implica la presencia de sintomatología ansiosa y/o depresiva, indicaron tener mayor miedo al contagio de COVID-19 (31,1%) en comparación con los que indicaron tener miedo ocasionalmente (23,3%) o no tenerlo (11,3%).

DÉFICIT EN LA CALIDAD DE SUEÑO SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 18 AÑOS Y MÁS.

Julio - Octubre 2021




Se observa una peor calidad de sueño en quienes tuvieron miedo a contagiarse de COVID-19. Dos de cada diez personas que dijeron tener siempre o muchas veces miedo a contagiarse en el último mes, refieren una mala calidad de sueño, en comparación con el 13% de las personas que no tuvieron miedo a contagiarse.

RESUMEN DE EVIDENCIAS


- En las personas con un estilo de afrontamiento negativo al estrés se observa una mayor frecuencia de miedo al contagio (29,5%). Consecuentemente, los perfiles con estilos de afrontamiento no evitativos o negativos afirman tener miedo ocasionalmente o no tenerlo (23,3% y 16,9% respectivamente).
- Una tendencia similar se observa en relación a la creencia de control externo, ya que quienes sostienen tener miedo al contagio siempre o a veces presentan menor capacidad de control desde lo personal (30% aproximadamente), en tanto cuando disminuye la creencia del control externo (20,7%) no tienen miedo al contagio.
- El déficit de felicidad es mayor (17,9%) en aquellas personas que indicaron tener miedo al contagio de COVID-19, en comparación con aquellas personas que indican tener miedo ocasionalmente (14,8%) o no tenerlo (9,2%).

AFRONTAMIENTO NEGATIVO Y CREENCIA DE CONTROL EXTERNO SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021

AFRONTAMIENTO NEGATIVO SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO




CREENCIA DE CONTROL EXTERNO SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO



SENTIMIENTO DE FELICIDAD SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO

PORCENTAJE PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS


Julio - Octubre 2021



APOYO SOCIAL ESTRUCTURAL SEGÚN ESTADO DE VACUNACIÓN

PORCENTAJE PERSONAS DE 18 AÑOS Y MÁS

Julio - Octubre 2021



Se evidencia que aquellas personas que se han vacunado, tanto con una o dos dosis, han tenido apoyo social estructural con tendencias similares (cercasas al 8% en su déficit). En cambio las personas que dicen no contar con una red social de soporte (15,5%) declaran con mayor frecuencia no haberse vacunado.

RESUMEN DE EVIDENCIAS


- Los resultados indican que quienes perciben un mayor déficit en el estado de salud se han vacunado, específicamente, el 16% de las personas que han recibido el esquema completo de vacunación -las dos dosis de la vacuna- refieren tener bastantes problemas o problemas graves o crónicos de salud. En este sentido también sería lógico ya que las personas con enfermedades incluidas en grupos de riesgo han sido vacunadas con prioridad al resto.
- Resulta notable que la mitad de las personas que no se han vacunado (53%), tampoco hayan realizado una consulta médica en el último año. Quienes recibieron dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, muestran un menor déficit de consulta médica (25,6%).
- En línea con los resultados anteriores, se observa un mayor déficit de consulta médica en el último año (37,4%), en aquellas personas que no han tenido miedo a contagiarse de COVID-19. En cambio, el 29% de las personas que siempre o muchas veces han tenido miedo a contagiarse, refieren no haber realizado una consulta médica.

ESTADO DE SALUD PERCIBIDO Y ACCESO A LA CONSULTA MÉDICA SEGÚN ESTADO DE VACUNACIÓN


EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 18 AÑOS Y MÁS

Julio - Octubre 2021


DÉFICIT EN EL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO



DÉFICIT EN LA CONSULTA MÉDICA



CONSULTA MÉDICA SEGÚN MIEDO AL CONTAGIO EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 18 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021




Situación de las personas mayores en el contexto de pandemia



-
- Las personas mayores son consideradas uno de los grupos más vulnerables ante el COVID-19, ya que tienen más probabilidades de presentar síntomas graves, un agravamiento del cuadro clínico y de muerte.
 - El Plan Estratégico de Vacunación del año 2020 estableció que las personas mayores de los aglomerados urbanos formaron parte del grupo prioritario para recibir la vacuna contra el COVID-19 en el país.
 - Si bien la letalidad es mayor para este grupo etario, en el 2021 se observa una disminución de la misma para las personas mayores.


MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN HABER TENIDO O NO COVID-19 EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021



Un 45,5% de las personas mayores que no tuvieron o creen no haber tenido COVID-19, sostienen tener miedo al contagio. Luego, le siguen con un 38,5% aquellos que transitaron la enfermedad con internación.

Estos datos son interesantes ya que en la población mayor de 18 años no se observan diferencias significativas entre el miedo que experimentan según si han transitado la enfermedad con o sin internación, o si no la tuvieron o creen no haberla tenido.


MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN ESTADO DE VACUNACIÓN EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 60 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021



Las personas mayores tienen mayor miedo al contagio en comparación con la población general. Aquellos que recibieron una dosis (49,1%), y los no vacunados (44,3%), son aquellos que tienen más miedo, en comparación con quienes recibieron dos dosis (42,3%). Completar el esquema de vacunación parece ser un factor que reduce el miedo al contagio de COVID-19.

En la población general, se observa que, de quienes tienen miedo al contagio, un 34,7% tiene dos dosis, un 29,8% una dosis y un 25,4% no se vacunó. Quienes tienen más miedo al contagio, son los vacunados con dos dosis.

MIEDO AL CONTAGIO SEGÚN ESTRATO SOCIO-OCUPACIONAL EN PORCENTAJE DE POBLACIÓN 60 AÑOS Y MÁS Julio - Octubre 2021




El miedo al contagio de COVID-19 aumenta a mayor vulnerabilidad socio-ocupacional, siendo este de 35,2% para el medio profesional, 36,8% para el medio no profesional, un 44,8% para el bajo integrado y se acentúa en el bajo marginal, con un 59%.

En la población general, el miedo al contagio según el estrato socio-ocupacional es menor. Se observa la misma tendencia al aumento del miedo conforme a la vulnerabilidad socio-ocupacional, representado por un 26,8% el medio profesional, 26,9% el medio no profesional, un 31,8% para el bajo integrado y 38,9% para el bajo marginal.

APOYO SOCIAL ESTRUCTURAL SEGÚN ESTADO DE VACUNACIÓN

PORCENTAJE PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS

Julio - Octubre 2021



Las personas mayores que no se han vacunado, poseen perfiles con déficit de apoyo social estructural de 32,1%, duplicando al déficit en este factor en la población general (15,5%). Se podría decir que el contar con una red de apoyo, promueve la vacunación contra el COVID-19, especialmente en este grupo etario.

A MODO DE CONCLUSIONES

- Al finalizar el relevamiento de la EDSA (octubre de 2021), el 19% de la población encuestada mencionaba haber contraído COVID-19, si bien la declaratoria es con menos frecuencia en personas de menor condición laboral, educativa y económica, en aquellos que residen en CABA, en las personas de mayor edad y sin diferencias por sexo.
- Los resultados sobre el estado de vacunación contra el COVID-19 indican que entre julio y octubre un 45,8% de la población urbana tenía una dosis de la vacuna, un 37,8% tenía dos dosis y un 16,3% todavía no se había vacunado.
- Los resultados sobre el estado de vacunación contra el COVID-19 en mayores de 18 años indican que un 16,3% no se vacunó. El grupo de 18 a 34 años es el que menos se vacunó. La mitad de los residentes en CABA alcanzan a aplicarse las 2 dosis.
- Según condición socio-ocupacional: la mitad de las personas que pertenecen al estrato medio profesional obtuvieron dos dosis y 1 de cada 4 de la población sin vacunar pertenece al estrato bajo marginal.

A MODO DE CONCLUSIONES

- La mitad de las personas que no han recibido la vacuna contra la COVID-19, dicen no tener miedo a contagiarse
- Un 60% afirma tener miedo al contagio de COVID-19, en los estratos socio-ocupacionales más bajos refieren tener más miedo al contagio.
- En el AMBA observaron menos temor, al igual que los varones, mientras que el nivel de miedo ante el contagio aumenta marcadamente según la edad.
- Los perfiles de recursos psicosociales como son el afrontamiento negativo al estrés, la creencia de control externo, el malestar psicológico y el sentimiento de infelicidad, así como las dificultades en el sueño se asocian con el miedo al virus.
- El apoyo social estructural demuestra ser un factor relevante al abordar la prevención contra el COVID-19 ya que a mayor red social hay mayor respuesta de vacunación en la población, en especial en el grupo de personas mayores.
- La mayoría de las personas que no se han vacunado tampoco han realizado un chequeo médico y manifiestan menor temor al contagio.
- Las personas mayores tienen mayor miedo al contagio en comparación con la población general y la mitad de los que no tuvieron COVID-19, sostienen tener miedo al contagio.



www.uca.edu.ar/observatorio



observatorio_deudasocial@uca.edu.ar



[@ODSAUCA](https://twitter.com/ODSAUCA)



[odsa_uca](https://www.instagram.com/odsa_uca)



UCA

ODSA

Observatorio
de la Deuda
Social Argentina